

黄颡鱼常见疾病诊治一览表

○ 长 太

诊治 鱼病	病原	症状	防治方法
出血性水肿病	由细菌感染所致。	病鱼体表泛黄,粘液增多,咽部皮肤破损充血,腹部膨大,肛门红肿,鳍条充血,肿大。	①加强水质管理,保持高溶氧。 ②0.03g/m ³ 二溴海因或3g/m ³ 优氯净全池泼洒。③饲料中加0.4‰复方新诺明拌和连喂3天。
水霉病	由水霉菌感染所致。	严重时菌丝侵入伤口,向外、向内生长,蔓延扩散,似灰白色棉毛。病鱼游动失常,焦躁不安。	①用生石灰彻底清塘消毒可减少疾病发生。②操作时勿使鱼体受伤。③20—40g/l食盐浸泡病鱼8—10分钟。
肠炎病	由细菌感染所致。	病鱼肛门红肿,轻压腹部有黄色粘液流出;病鱼离群独游,肠道发炎充血。	①1g/m ³ 漂白粉全池泼洒。②坚持“四定”投饵,定期在饲料中添加1%食盐或大蒜。③饲料中加0.1‰磺胺胍制成药饵连喂6天。
小瓜虫病	由多子小瓜虫感染所致。	病鱼的皮肤、鳍条、鳃上,肉眼可见白色小点状胞囊,严重时体表像覆盖一层白色薄膜,病灶处同时细菌感染,使体表发炎或鳍条烂裂。	①0.4g/m ³ 干辣椒和0.08g/m ³ 鲜姜加水煎煮辣姜汤全池泼洒,连用3天。②发病初期用60—80mg/l福尔马林药浴病鱼10—15分钟。③15—25mg/l福尔马林全池泼洒2—3次。
纤毛类寄生虫病	由斜管虫、车轮虫等寄生所致。	在体表、鳃和鳍上大量寄生,刺激鱼分泌大量粘液,表面形成黄白色或淡蓝色的粘液层。病鱼离群独游,头朝下,尾朝上,倒栽于水面或侧卧于水下,呼吸困难,不久即死亡。	①0.4—0.5mg/l硫酸铜、硫酸亚铁合剂(5:2)全池泼洒。②可用纤虫绝杀、灭虫净等商品药物治疗(用量严格按说明书或先试后用)。
甲壳类寄生虫病	由锚头鳋、日本鲺等寄生所致。	寄生在鱼的体表、鳃丝及鳍条上,病鱼在水中狂游乱窜,同时致病菌乘虚而入,造成体表皮肤溃烂,加速机体死亡。	①苗种放养前用生石灰或茶饼彻底清塘消毒。②90%晶体敌百虫0.3—0.4g/m ³ 浓度全池泼洒。
营养性疾病	饲料营养成份不足或变性所致。	病鱼肝脏肿大,颜色粉白色或发炎,胆囊肿大,胰脏色淡,病鱼零星死亡,且先死亡较大的个体。	改进饲料配方,提高饲料质量适当增加维生素和无机盐的用量。

(通联:224001,江苏盐都县农业资源开发局 电话:0515-8326649)