

池塘主养

异育银鲫

应注意的几个问题

○ 焦世璋

异育银鲫以其肉厚味美,病害少,生长快等优点现已被广大养殖户所接受。自永靖县引进异育银鲫并进行池塘主养,取得了好的经济效益,调整了永靖县原来仅养“四大家鱼”的养殖结构,现就池塘主养异育银鲫谈谈自己的看法,供大家参考。

一、鱼种的培养和选择。最好选用当地地产的鱼种,在晴好天气,现捕、现运、现投放。选择每千克 25—30 尾、纯种、健壮、均匀的异育银鲫鱼种。若从外地购买,一般购买“乌仔”鱼苗比较合算,进行鱼种培养,然后进行成鱼养殖较为理想。若购进鱼种要注意运输安全,避免因长途运输而损伤鱼体。

二、放养密度及品种搭配。从养殖情况看,每千克 30 尾规格的亩放 900 尾收获的成鱼规格好,尾重可达 250 克以上,这样规格的产量与效益最佳,成鱼容易销售,而且价格高。成鱼低于这样的规格,不但价格大幅度降低,而且难以销售。故鱼种的规格不能太小,放养密度不能太大。

搭配鱼种主要以鲢鳙鱼为主,并适量,鲢鳙每亩 450 尾,鲢鳙比例为 8:1,切忌搭配大规格鲤鱼和草鱼种。即使搭配,数量也不能多,因为这两种鱼达到一定数量,形成群体后,喂食时,它们先来抢食,骚扰主养异育银鲫抢不上食,严重影响异育银鲫的生长。同时也给日常投喂、管理、防病带来不便,加之草鱼、鲤鱼的吃食量大,上市规格讲究季节性,价格且不高,效益得不偿失。

三、饲养管理。在饲喂上应根据“四定”投饲法,即定时、定量、定质、定位。此外,因异育银鲫吞食颗粒饲料的能力较差,所以,喂养异育银鲫的颗粒饲料

大小要适宜于它的摄食,不能太大、太硬,一般以米粒大小最好。因搭配了鲢鳙鱼,异育银鲫又是杂食性,所以池水要保持足够的肥度,3 月份开始施放有机发酵堆肥,一般每亩 100—300 千克,做到少量多次地投放,主养池每月可追施 1—2 次磷肥,每次每亩 60—70 千克,透明度可保持在 25—30 厘米。在饲料分配上,一般 2—4 月占全年饲料的 8% 左右,5—6 月占 18%—25%,7—9 月占 65%—70%,10—11 月占 5% 左右。投入饲料确保都被摄食而不浪费,以提高其利用率。在投喂饼类时,提倡先敲碎用水浸软,添加淀粉等粘合剂,做成适口表面光滑的颗粒饲料,保持饲料在水中 15 分钟不散,减少饲料在水中散失以提高其利用率,降低饲料成本,也可防止水质因饲料污染而恶化。饲料要新鲜适口,不霉变。根据异育银鲫和配养鱼的生长规格、气候变化及水温高低决定投饵量,以鱼在投饲后 2 小时内吃完为准,使各种鱼都能得到充分生长,求得最佳效益。

四、水质管理及病害防治。在保持水质“肥”、“活”、“嫩”、“爽”的基础上,每亩一般配 0.3 千瓦左右的增氧机一台。在生长季节要根据水温每隔 10—15 天给池塘加水一次,早晚开增氧机 1—2 小时,在天气连阴下雨时也要及时开增氧机调节池水的溶氧防治池塘泛塘。为了预防疾病的发生,每月用 60ppm 生石灰化水全池泼洒一次,病期用 0.3% 的痢特灵药饵投喂,每天一次,连喂三天;鲢死亡率高时,用 1ppm 硫酸铜全池泼洒,效果良好。

(通联:731600,甘肃永靖县畜牧局渔业工作站)