

15

异育银鲫高效精养八字经

宋长天 董作忠
(江苏省盐城市盐垦技术站 224001)

鱼 15~20 尾,可收获鲢、鳙成鱼 100kg 左右。也可混养规格比异育银鲫小的加州鲈鱼,每亩 6~10 尾。

异育银鲫是用黑龙江方正鲫鱼为母本,兴国红鲤为父本,经杂交后雌核发育的仔代,具有食性广、易饲养、生长快、产量高、养殖周期短等特点。在养殖中显示了良好的生产效果,其成鱼在全国各地都很畅销,近年来已销往韩国市场。我们在推广异育银鲫养殖过程中,其“水、种、饵、密、混、轮、防、管”八字经验。总结如下:

水:异育银鲫食用鱼养殖对池塘的要求不特殊,养殖面积不限,一般以 10~15 亩为好,水深 1.5~2.5m,池底有 10~15cm 厚的淤泥。养殖水源要求清新、无污染、水量充足。池塘的清理、消毒、施基肥等均按常规方法进行。养殖过程中,以瘦水为主,透明度 30~35cm,溶解氧 4~5mg/l,7~9 月份每周加水 1 次,半个月左右换水 1 次,每次换水 20~30cm。

种:选择品种纯正、体质健壮、无病无伤、规格一致的鱼种,鱼种有尾重 1g 左右的当年夏花,尾重 50g 左右和尾重 100g 左右的一龄鱼种。

饵:最好投喂沉性颗粒饵料,也可用菜饼、棉粕、麦粉等饲料混合投喂。饵料的蛋白质含量掌握在 32% 左右,鱼种规格 5~10g 投饵率为 9%~12%; 50~100g 投饵率 6%~

9%; 100g 以上 5% 左右。水温 $\leq 15^{\circ}\text{C}$,按鱼体重 1% 计算日投饵量,每周投喂 3 次;水温 16~19 $^{\circ}\text{C}$ 按上述投饵率 60% 计算投饵量,每日投喂 2 次;水温 20~23 $^{\circ}\text{C}$ 和 30 $^{\circ}\text{C}$ 以上按上述投饵率的 80% 计算投饵量,日投 2~3 次;水温 24~29 $^{\circ}\text{C}$ 按上述投饵率投喂,日投喂 3 次。

密:放养密度根据欲养成规格和产量具体确定。苗种培育:欲出塘规格尾重 35~75g,亩放 3cm 以上的夏花 8000~10000 尾;欲出塘规格尾重 75~100g,亩放 5000~6000 尾。可培育异育银鲫鱼种 250~300kg。成鱼养殖:可放尾重 50g 的鱼种 1500~2000 尾(计划轮捕上市的塘口,放养数量可适当增加)、养成规格尾重 250g 左右,亩产异育银鲫 350~400kg,放养尾重 1g 左右的当年夏花可套养下年大规格鱼种;在密度稀的情况下,进行快速养殖,当年也可养成尾重 150g 以上的成鱼。放养尾重 100g 左右的大规格鱼种可在夏秋季轮捕上市。一般池塘三种规格的鱼种都放,可显著提高产量和效益。

混:主养异育银鲫的塘口忌放鲤、草、鳊等吃食性鱼类,为了控制肥水,可混养规格小于尾重 25g 的鲢、鳙鱼,一般亩混养鲢鱼 150~200 尾,鳙

轮:为了提高产量,调节市场,增加效益。异育银鲫主养塘可在 6 月份以后开始轮捕上市,一般每半个月轮捕 1 次,可采取张“花蓝”的方法捕捞,选择符合规格的成鱼上市,未达规格的幼鱼继续留塘饲养。如果轮捕数量较多,可补放部分大规格当年夏花,始终保持池塘中较适宜的密度。

防:在放养鱼种前半个月对池塘进行清理,并用生石灰、漂白粉、敌百虫等药物进行消毒。鱼种用 2%~3% 的食盐水浸洗 5~10 分钟后下塘,注水时要加上拦网,防止野杂鱼类带入病虫害。20 天左右全池泼洒 1 次生石灰,用量为 15~25ppm。在鱼病暴发期前,全池泼洒 1 次漂白粉,用量为 1~1.2ppm,并投喂药饵 3~5 天,可用 1kg 井冈霉素、60g 痢特灵与 50kg 饲料拌和投喂。同时要作好防浮头、防汛、防偷等工作。

管:管理工作内容很多,主要有一巡五勤。一巡就是坚持早晚巡塘,观察鱼类生长(每 10 天打样测定鱼规格 1 次)活动情况,饵料是否残剩或不足,可在吃食结束后检查食场,并及时增减调整投饵量。五勤即勤捞除剩渣残饵;勤清洗消毒食台;勤注入新水调节水质;勤视鱼进食与投饵情况;勤记录分析处理问题。

