



彻底清塘消毒 适合异育银鲫速成养殖的塘口面积以8~20亩为宜,在放养夏花(5月20日)前,按鱼种池的标准要求彻底清塘消毒,并及时培肥水质。

抢抓季节 异育银鲫速成养殖,是利用当年人工繁殖鱼苗,通过强化培育、稀放精管,从而达到当年育成商品鱼上市的目的。因此季节上要求比较严格,原则上应选用头批人繁鱼苗,按每

亩作繁殖的亲鳅要选择二龄以上,成熟度较好,体质健壮,无病无伤的泥鳅。雌泥鳅最好选取体长15厘米以上、体重20克以上、腹部膨大和胸鳍宽而前端圆的个体;雄泥鳅选取长和体重略小于雌泥鳅、胸鳍狭窄而前端较尖的个体。

由于条件所限,养殖户最好采取人工授精的方式,如果轻压雌泥鳅腹部有卵粒流出、雄泥鳅腹部有精液流出,即可进行人工授精。将挤出的卵子和精液混合在一个搪瓷盆中,加水后再打两个鸡蛋轻轻搅动1~2分钟,使其进入正常孵化阶段,一般2天左右可孵出鳅苗。鳅苗孵出后,水中的鸡蛋就成为了它们的食物。这样,鳅苗的成活率极高。

3天后,可以将鳅苗转入池中饲养。放养前先铺肥泥20~25厘米厚,并施足基

亩10万尾通过发花池进行1个月左右的强化培育,并及时分塘饲养。速成养殖的塘口,每亩放夏花掌握在2000尾左右,花白鲢插放夏花300尾。

精心饲管 夏花入塘后,应选用鱼种颗粒饵料及时开机驯喂,并根据生产规格调整饲料的规格与投饵量。每3~5天加水1次。每10~15天用20×10⁻⁶浓度的生石灰水防病消毒1次,发现疾病和浮头现象要有针对性地及时处理。

择机上市 经过7个月的强化培育和精心饲管,一般异育银鲫能达到250克/尾,适宜选在每年4月份上市销售,既可售出较高的价格,又可与下年生产形成连接。

江苏省金湖县陈桥镇农技中心
 (211600)潘玉梅

人工饲养泥鳅

肥(牛、猪、鸡、鸭粪均可),水面上植藻类、水浮莲等水生植物,或用树枝、禾草等遮荫。放养密度为每平方米10万~20万尾。放养后开始投饵,初期投喂蛋黄、大豆粉、焙干的蚯蚓等,以后投喂配合饲料。投喂量开始占种苗总体重的2%~5%,以后增至10%,每天上、下午各投喂1次。鳅苗体长达10厘米时,进入成鱼饲养阶段。成鳅饲养阶段一般在水田里进行,时间选在插秧后投放,每亩投放量约为2万尾。同时,要注意水田的水深最好不要超过10厘米。在水田中,还要多养鸭子,鸭子可吃掉水中的害虫和杂草,其粪便还可以成为泥鳅的食物,一举多得。(王林)

40 2005.20

江苏省吴江市七都镇的“庙港”牌、“阿四”牌、“七都”牌和“万顷”牌太湖蟹全部通过国家有机食品审核。